

CAUSAR?

Aumento da pressão arterial.

Pacientes com problemas hepáticos podem apresentar toxicidade com o uso prolongado.

O uso de produtos contendo guaco por pacientes com hipersensibilidade à cumarina, principal componente ativo do guaco, e seus derivados, podem apresentar um agravamento nos quadros de falta de ar e tosse.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTE MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?

A ingestão de altas doses e por tempo prolongado de produtos contendo guaco pode ocasionar aumento da frequência dos batimentos cardíacos, vômitos e quadros diarreicos, que desaparecem com a interrupção do uso.

Em caso de superdosagem, recomenda-se suspender o uso e procurar orientação médica.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

Reg. MS nº 1.3841.0032

Farm. Responsável: Tales de Vasconcelos Cortes – CRF/BA nº 3745

NATULAB LABORATÓRIO S.A.

Rua H, nº 2, Galpão 03 – Urbis II

Santo Antonio de Jesus – Bahia - CEP 44.574-150

CNPJ 02.456.955/0001-83

INDÚSTRIA BRASILEIRA

SAC: (75) 3311 5555

Natulab
Laboratório Farmacêutico



Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

XAROPE DE GUACO NATULAB

Espécie vegetal: *Mikania glomerata*

Nome popular: Guaco

Família: Asteraceae

Parte utilizada: folhas

APRESENTAÇÃO:

Forma farmacêutica: xarope – 117,6 mg/mL (equivalente a 0,082 mg de cumarina/mL de xarope).

Frasco pet âmbar contendo 80, 100, 120 e 150 mL.

USO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS

COMPOSIÇÃO:

Cada mL do xarope contém:

extrato fluido de das folhas de *Mikania glomerata* S 117,6 mg
veículo (Carmelose sódica, metilparabeno, propilparabeno, sucralose, sorbitol, aroma de menta, aroma de mel e água purificada)..... q.s.p. 1 mL

CONCENTRAÇÃO DE PRINCÍPIO ATIVO

O Extrato seco está padronizado em 0,075 cumarina . Cada mL do xarope contém 0,082 mg de cumarina.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Expectorante e Broncodilatador.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O medicamento XAROPE DE GUACO NATULAB é indicado para o tratamento de doenças do trato respiratório, promovendo o relaxamento da musculatura lisa dos brônquios, auxiliando na eliminação das secreções brônquicas e no combate à tosse.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Gestação e lactação.

Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico.

Não ingerir doses maiores do que a recomendada.

Recomenda-se maior critério na administração de xarope de guaco em pacientes com quadros respiratórios crônicos não diagnosticados (afastar a hipótese de tuberculose e câncer).

Este medicamento não deve ser utilizado em crianças menores de 2 anos de idade.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Produtos contendo guaco não devem ser empregados concomitantemente com anticoagulantes, pois as cumarinas podem potencializar seus efeitos e antagonizar o efeito da vitamina K.

As saponinas presentes na *Mikania glomerata* aumentam a absorção do lapachol, princípio ativo presente na *Tabebuia avellanae* (ipê-roxo). Desta forma, o uso concomitante de produtos contendo Guaco com antiacoagulantes, vitamina K e Ipê Roxo deve ser realizado somente com orientação médica.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Este medicamento não deve ser utilizado em crianças menores de 2 anos de idade.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar em temperatura ambiente (15 a 30°C). Proteger da luz, do calor e da umidade. Manter o frasco bem fechado. Nestas condições, o medicamento se manterá próprio para o consumo, respeitando o prazo de validade indicado na embalagem.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua

embalagem original.

XAROPE DE GUACO NATULAB é apresentado na forma líquida, de cor verde acinzentada, odor e sabor mel mentolado.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

XAROPE DE GUACO NATULAB é apresentado na forma líquida, de cor verde acinzentada, odor e sabor mel mentolado.

Adultos: Ingerir 1 colher de sopa (15 ml – equivalente a uma dose de 0,206 mg de cumarinas) 3 (três) vezes ao dia.

Crianças maiores de 5 anos: Ingerir 1/2 (metade - equivalente a uma dose de 0,103 mg de cumarinas) da dose.

Crianças de 2 a 5 anos: Ingerir 1/3 da dose (equivalente a uma dose de 0,069 mg de cumarinas).

Não existem recomendações específicas para o uso do XAROPE DE GUACO NATULAB por pacientes idosos e outros grupos de risco

Agite o produto antes de usar. Uso oral.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

Não use o medicamento com prazo de validade vencido. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso você esqueça de tomar a dose no horário estabelecido pelo seu médico, tome-o assim que lembrar. Entretanto, se já estiver perto do horário de tomar a próxima dose, pule a dose esquecida e tome a próxima, continuando normalmente o esquema de doses recomendado pelo seu médico. O esquecimento da dose pode comprometer a eficácia do tratamento.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE